

UNitears® preservative free

Akių lašai (tirpalas), be konservantų

APPROVED

By Žydrūnė Urbanavičiūtė at 10:22 am, Nov 12, 2020

1. Kas yra UNitears preservative free ir kam jis naudojamas

UNitears preservative free yra akių lašai (tirpalas), kurių sudėtyje yra hipromeliozės ir dekspantenolio. Jie sukelia apsaugomąjį ir drėkinamąjį poveikį bei skatina epitelizaciją. Hipromeliozė akies paviršiuje sudaro laikiną apsauginę plėvelę, drėkina akies paviršių ir veikia kaip ašarų pakaitalas sumažėjus jų išsiskyrimui. Ji pašalina akių sausumo pojūtį bei lengvą neinfekcinių priežasčių sukeltą akių dirginimą. Dekspantenolis (B grupės vitaminas) padeda atkurti akies paviršiaus ląsteles (skatina epitelizaciją).

UNitears preservative free sudėtyje nėra konservantų, todėl šie akių lašai ypač tinka žmonėms, kurie nešioja akių kontaktinius lęšius ir kurių akys yra jautrios.

UNitears preservative free sukelia ilgalaikį būklės pagerėjimą:

- sumažėjus ašarų išsiskyrimui, esant sausų akių sindromui (sausajam keratokonjunktyvitui);
- esant pažeidimui ir ragenos erozijai;
- po akių operacijos;
- esant akių diskomfortui (deginimui, niežėjimui, svetimkūnio pojūčiui; tokie simptomai gali būti susiję su išoriniais veiksniais, pvz., oro kondicionavimu, vėju, teršalais, dūmais, dulkėmis);
- padidėjus akių įtampai (ilgai dirbant kompiuteriu) ir pasunkėjus regai dienos metu;
- nešiojant kontaktinius lęšius.

UNitears preservative free gali naudoti suaugusieji, paaugliai ir vaikai.

2. Kas žinotina prieš naudojant UNitears preservative free

UNitears preservative free naudoti negalima:

- jeigu yra alergija bet kuriai sudedamajai šių akių lašų medžiagai;
- jeigu yra ūminė akies korozinio pažeidimo fazė; būtina palaukti, kol iš junginės maišelio bus pašalintos visos korozinės medžiagos ir nekrozavę audiniai.

Jei tuo pat metu naudojate kitokių akių preparatų, paprastai rekomenduojama, kad tarp jų lašinimo praeitų ne mažiau kaip 5 minutės.

3. Kaip naudoti UNitears preservative free

Paprastai 2-3 kartus per dieną lašinamas 1 lašas, tačiau galima naudoti ir dažniau. UNitears preservative free galima naudoti ilgai.

Įspėjimas


Įsilašinus šių akių lašų, laikinai gali pasireikšti nestipraus deginimo pojūtis, matomas vaizdas gali tapti neryškus. Vairuokite ir valdykite mechanizmus tik tada, kai matomas vaizdas taps aiškus.

Kontaktinius lęšius nešiojantys žmonės

UNitears preservative free galima naudoti įsidėjus kontaktinius lęšius.

Atsargumo priemonės prieš naudojimą


1. Nusiplaukite rankas ir patogiai atsistokite ar atsistokite.
2. Nusukite buteliuko dangtelį.



3. Buteliuką laikykite apverstą nykščiu ir kitu pirštu.
4. Prieš pirmąjį naudojimą rekomenduojama švelniai spaudžiant buteliuką nulašinti pirmą lašą, nes dėl stipraus ir netolygaus buteliuko suspaudimo gali būti išspausstas didesnis tūris.
5. Pirštu švelniai patraukite pažeistos akies voką žemyn.



6. Lašintuvo galiuką priartinkite prie akies, tačiau jos ar aplinkinių sričių liesti negalima.
7. Švelniai suspauskite buteliuką, kad į akį įkristų tik 1 lašas. Tada atleiskite apatinį voką ir lėtai užsimerkite, kad UNItears tolygiai pasiskirstytų akies paviršiuje.
Norėdami įlašinti kitą lašą, įtraukite orą atgal į plastikinį buteliuką, kad jis sugrįžtų į pradinę padėtį, ir tada vėl lašinkite į akį, kaip rekomenduojama. Žinokite, kad tarp buteliuko suspaudimo ir lašo nukritimo gali praeiti kelios sekundės. Buteliuko negalima spausti per stipriai.



8. Jei reikia, procedūrą pakartokite į kitą akį.



9. Po panaudojimo buteliuką reikia vieną kartą pakratyti žemyn (galiuko liesti negalima), kad iš galiuko būtų pašalintas bet koks skysčio likutis. Tai reikalinga akių lašų sterilumui užtikrinti ir lašinimui palengvinti kito vartojimo metu.
10. Iš karto po panaudojimo sandariai užsukite buteliuko dangtelį.

4. Galimas šalutinis poveikis

Retai iš karto po panaudojimo gali pasireikšti nestiprus laikinas deginimo pojūtis ar alerginė reakcija į kurią nors sudedamąją medžiagą arba laikinas blakstienų sukibimas.

Jeigu atsiranda bet kokių minėtų simptomų ar kitokių neįprastų reakcijų, kreipkitės į gydytoją arba vaistininką.

5. UNItears preservative free sudėtis

Hipromeliozė 5 mg/1 ml, dekspantenolis, natrio chloridas, dinatrio edetatas dihidratas, išgrynintas vanduo.

6. Kaip laikyti UNItears preservative free ir kita informacija

Buteliuką laikyti gamintojo dėžutėje, 25 °C temperatūroje.

Negalima šaldyti ar užšaldyti.

Laikyti vaikams nepasiekiamoje ir nepastebimoje vietoje.

Ant etiketės ar dėžutės šalia smėlio laikrodžio piktogramos nurodytam tinkamumo laikui pasibaigus, šių akių lašų naudoti negalima. Akių lašai tinkami naudoti iki paskutinės nurodyto mėnesio dienos.

Po pirmojo atidarymo negalima naudoti ilgiau kaip 3 mėnesius.

Pakuotės dydis: 1 x 10 ml



UNIMED PHARMA, spol. s r.o., Orišková 11, 821 05 Bratislava, Slovakijos Respublika

Tel.: +421 2 4333 3786

Faksas: +421 2 4363 8743

El. paštas: unimedpharma@unimedpharma.sk

www.unimedpharma.eu



Ši instrukcija paskutinį kartą atnaujinta 2020 m. balandžio mėn.